子どもの定期予防接種スケジュール早見表（令和4年度）

□：対象の月齢・年齢　①～④：接種回数　**矢印・太字**：接種間隔

R4年4月

ワクチン	出生	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	1歳	1歳半	2歳	3歳	3歳半	4歳	5歳	6歳	7歳	7歳半	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳～25歳
B型肝炎		①→② 27日以上 ③ 1回目から139日以上										3回接種																		
ヒブ（インフルエンザ菌b型）		①→ 27～56日 ②→ 27～56日 ③ 3回目から7か月～13か月まで ④										4回接種																		
小児用肺炎球菌		①→ 27日以上 ②→ 27日以上（生後12か月までに3回接種する） ③ 3回目から60日以上 ④ 1歳になってから（1歳3か月までが望ましい）										4回接種																		
ロタウイルス		ロタリックス ①→ 27日以上（初回接種は56日～98日までが望ましい） ②										2回接種																		
		ロタテック ①→ 27日以上 ②→ 27日以上（初回接種は56日～98日までが望ましい） ③										3回接種																		
4種混合（ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオ混合ワクチン）			①→ 20～56日 ②→ 20～56日 ③ 3回目から6か月以上（1年～1年半後が望ましい） ④									4回接種																		
結核（BCG）		生後5～8か月の間に1回接種 ①										1回接種																		
麻しん風しん混合（MR）												① 1歳になったら1回目を接種																		
																		② 2回目は年長で接種												2回接種
水痘（みずぼうそう）												①→② 3か月以上（6か月～1年が望ましい）																		2回接種
日本脳炎															①→②→ 6～28日 ③ 6か月以上（1年後が望ましい）														
																														4回目は小4で接種 ④ 4回接種
2種混合（ジフテリア・破傷風混合ワクチン）																														1回接種 ① 小6で接種
ヒトパピローマウイルス感染症（子宮頸がん予防：HPV）																														サーバリックス ①→ 1か月以上 ②→ 1回目から5か月以上かつ2回目から2か月半以上 ③ 3回接種
																														ガーダシル ①→ 1か月以上（2か月が望ましい） ② 2回目から3か月あける（1回目から6か月以上あけるのが望ましい） ③ 3回接種

←どちらかのワクチンで接種を完了してください。

小学校6年生～令和4年度に25歳になる女性が対象

どちらかのワクチンで接種を完了してください。→