

こどもの定期予防接種について 健康増進課 ☎561-2323

予 防 接 種 の 種 類		接種対象月齢・年齢	接種開始の月齢・年齢	接種回数	接種間隔・注意事項等
小児の肺炎球菌感染症 望ましい接種開始時期 生後2~7か月になる1日前	接種開始月(年齢)により	生後2か月～5歳の誕生日の1日前	生後2~7か月になる1日前	4回	●初回接種: 27日以上の間隔で、2歳の誕生日の1日前まで(生後12か月までが望ましい)に3回接種 ●追加接種: 3回目接種後60日以上あけ、1歳になってから(1歳3か月までが望ましい)1回接種
			生後7か月～1歳の誕生日の1日前	3回	●初回接種: 27日以上の間隔で、2歳の誕生日の1日前まで(生後13か月までが望ましい)に2回接種 ●追加接種: 2回目接種後60日以上あけ、1歳になってから1回接種
			1~2歳の誕生日の1日前	2回	●60日以上の間隔で2回接種
			2~5歳の誕生日の1日前	1回	●1回接種
予 防 接 種 の 種 類		接種対象月齢・年齢	標準的な接種期間	接種回数	接種間隔・注意事項等
B 型 肝 炎		生後すぐ～1歳の誕生日の1日前	生後2~9か月になる前まで	3回	1回目接種から27日以上の間隔で2回目を接種 1回目から139日以上の間隔で3回目を接種
ロタウイルス感染症 ※どちらかのワクチンで接種を完了してください	ロタリックス	生後6週～24週まで		2回	27日以上の間隔で2回接種 ただし、初回接種は生後8週から14週までが望ましい
	ロタテック	生後6週～32週まで		3回	27日以上の間隔で3回接種 ただし、初回接種は生後8週から14週までが望ましい
結 核 ( B C G )		生後すぐ～1歳の誕生日の1日前	生後5~8か月になる前まで	1回	
5種混合(DPT-I PV-Hib) (ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオ混合・Hib感染症)	第1期	生後2か月～7歳6か月になる1日前	生後2か月～7か月になる1日前	4回	●初回接種: 20日以上の間隔(20~56日までが望ましい)で3回接種 ●追加接種: 3回目終了後、6か月以上あけて(1年~1年半後が望ましい)1回接種
	第2期	11~13歳の誕生日の1日前	11歳		
ジフテリア・破傷風混合(DT)				1回	
水 痘		1~3歳の誕生日の1日前	1回目は生後12月～15月の間が望ましい	2回	●2回目は、1回目の接種後3か月以上あけて(6か月~1年 が望ましい)接種。
麻しん風しん混合 ( M R )	第1期	1~2歳の誕生日の1日前	小学校入学の前年(幼稚園や保育園の年長クラス)	2回	●麻しん(はしか)、風しんのいずれかにかかった場合でも、混合ワクチンで接種が可能です。 ●第2期の対象の人は、令和8年度に6歳になる人(令和2年4月2日~令和3年4月1日生まれの人)です。令和8年4月~令和9年3月末までに接種してください。
	第2期	5~7歳未満で小学校就学前の1年間			
日 本 脳 炎	第1期	生後6か月～7歳6か月になる1日前	3歳	3回	●初回接種: 6日以上の間隔(6~28日までが望ましい)で2回接種 ●追加接種: 2回目終了後6か月以上あけて(約1年後が望ましい)1回接種
			4歳		
	第2期	9~13歳の誕生日の1日前	9歳	1回	
子宮頸がん予防 (ヒトパピローマウイルス感染症: HPV)		平成22年4月2日生~平成27年4月1日生の女性(小学6年生~高校1年生相当の女性)	中学1年生の女性	2回	1回目の接種を15歳になるまでに受ける場合。 ※1回目の接種と2回目の接種は5か月以上あけます。5か月未満の場合、3回目の接種が必要です。
				3回	1回目の接種を15歳になってから受ける場合。 1回目から2か月の間隔をおいて2回目、1回目から6か月の間隔をおいて3回目を接種します。 ※上記の方法で接種できない場合は、1か月以上の間隔をおいて2回目を接種、2回目から3か月以上おいて3回目を接種する

こどもの定期予防接種

※平成18年4月2日~平成19年4月1日生まれの方は、20歳になる1日前までの間に1期・2期を接種することができます。