

こどもの定期予防接種について

健康増進課 ☎561-2323

予防接種の種類		接種対象月齢・年齢	接種開始の月齢・年齢	接種回数	接種間隔・注意事項等	
小児の肺炎球菌感染症 望ましい接種開始時期 生後2～7か月になる1日前	接種開始月（年齢）により 接種回数が異なります	生後2か月～ 5歳の誕生日の 1日前	生後2～7か月 になる1日前	4回	●初回接種：27日以上の間隔で、2歳の誕生日の1 日前まで（生後12か月までが望ましい） に3回接種 ●追加接種：3回目接種後60日以上あけ、1歳になっ てから（1歳3か月までが望ましい）1回 接種	
			生後7か月～ 1歳の誕生日の 1日前	3回	●初回接種：27日以上の間隔で、2歳の誕生日の1 日前まで（生後13か月までが望ましい） に2回接種 ●追加接種：2回目接種後60日以上あけ、1歳になっ てから1回接種	
			1～2歳の誕生日の 1日前	2回	●60日以上の間隔で2回接種	
			2～5歳の誕生日の 1日前	1回	●1回接種	
予防接種の種類		接種対象月齢・年齢	標準的な接種期間	接種回数	接種間隔・注意事項等	
B型肝炎		生後すぐ～1歳の 誕生日の1日前	生後2～9か月 になる前まで	3回	1回目接種から27日以上の間隔で2回目を接種 1回目から139日以上の間隔で3回目を接種	
ロタウイルス感染症 ※どちらかのワクチン で接種を完了してく ださい	ロタリ ックス	生後6週～24週 まで		2回	27日以上の間隔で2回接種 ただし、初回接種は生後8週から14週までが望ましい	
	ロタテ ック	生後6週～32週 まで		3回	27日以上の間隔で3回接種 ただし、初回接種は生後8週から14週までが望ましい	
結核（BCG）		生後すぐ～1歳の 誕生日の1日前	生後5～8か月 になる前まで	1回		
5種混合（DPT-I PV -Hib） （ジフテリア・百日せき・ 破傷風・不活化ポリオ・ Hib感染症混合）	第1期	生後2か月～7歳 6か月になる1日前	生後2か月～ 7か月になる1日前 右記のとおり	4回	●初回接種：20日以上の間隔（20～56日までが望 ましい）で3回接種 ●追加接種：3回目終了後、6か月以上あけて（1年 ～1年半後が望ましい）1回接種	
	ジフテリア・ 破傷風混合（DT）	第2期	11～13歳の 誕生日の1日前		11歳	1回
水痘		1～3歳の誕生日の1日前		1回目は生後12月～ 15月の間が望ましい	2回	●2回目は、1回目の接種後3か月以上あけて（6か 月～1年が望ましい）接種。
麻しん風しん混合 （MR）	第1期	1～2歳の誕生日の 1日前		2回	●麻しん（はしか）、風しんのいずれかにかかった場 合でも、混合ワクチンで接種が可能です。 ●第2期の対象の人は、令和7年度に6歳になる人（平 成31年4月2日～令和2年4月1日生まれの人）です 。令和7年4月～令和8年3月末までに接種してく ださい。	
	第2期	5～7歳未満で小学 校就学前の1年間				小学校入学の前年 （幼稚園や保育園 の年長クラス）
日本脳炎	第1期	生後6か月～7歳 6か月になる1日前	3歳	3回	●初回接種：6日以上の間隔 （6～28日までが望ましい） で2回接種 ●追加接種：2回目終了後6か月 以上あけて（約1年後が望ましい） 1回接種	
	第2期	9～13歳の誕生日の 1日前	4歳 9歳			
子宮頸がん予防 （ヒトパピローマウイル ス感染症：HPV）	定期接種対象者 平成21年4月2日生～平成26 年4月1日生の女性（小学6年 生～高校1年生相当の女性）		中学1年生の女性	一般的な接種スケジュール シルガード®9 1回目の接種を15歳になるまでに受ける場合 0か月 1回目 6か月 2回目 合計 2回 1回目の接種を15歳になってから受ける場合 0か月 2か月 6か月 1回目 2回目 3回目 合計 3回 ガーダシル® 0か月 2か月 6か月 1回目 2回目 3回目 サーバリックス® 0か月 1か月 6か月 1回目 2回目 3回目		
	キャッチアップ接種経過措置について 平成9年4月2日から平成21年4月1日生まれの女 性で、令和4年4月1日から令和7年3月31日ま での間に1回以上接種している人は令和8年3月31 日までの期間に残りの接種が公費接種として接種で きます。			3種類いずれも、1年以内に接種を終えることが望ましいとされています。 ※1 1回目と2回目の接種は、少なくとも5か月以上あけます。5か月未 満である場合、3回目の接種が必要になります。 ※2・3 2回目と3回目の接種がそれぞれ1回目の2か月後と6か月後にで きない場合、2回目は1回目から1か月以上（※2）、3回目は2回目 から3か月以上（※3）あけます。 ※4・5 2回目と3回目の接種がそれぞれ1回目の1か月後と6か月後にで きない場合、2回目は1回目から1か月以上（※4）、3回目は1回目 から5か月以上、2回目から2か月半以上（※5）あけます。		