

子どもの定期予防接種スケジュール早見表(令和5年度)

□:対象の月齢・年齢 ①~④:接種回数 矢印・太字:接種間隔

R5年4月

ワクチン	出生	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	1歳	1歳半	2歳	3歳	3歳半	4歳	5歳	6歳	7歳	7歳半	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳~26歳																		
B型肝炎	① → ② 27日以上												③ 3回接種												1回目から139日以上																							
ヒブ (インフルエンザ菌13型)	① → ② → ③ 27~56日 27~56日												④ 3回目から7か月~13か月まで												4回接種																							
小児用肺炎球菌	① → ② → ③ 27日以上 27日以上(生後12か月までに3回接種する)												④ 3回目から60日以上												④ 1歳になってから(1歳3か月までが望ましい)												4回接種											
ロタウイルス	ロタリックス ① → ② 27日以上(初回接種は生後8週~14週までが望ましい)												2回接種												←どちらかのワクチンで接種を完了してください。																							
	ロタテック ① → ② → ③ 27日以上 27日以上(初回接種は生後8週~14週までが望ましい)												3回接種																																			
4種混合 (ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオ混合ワクチン)	① → ② → ③ 20~56日 20~56日												④ 3回目から6か月以上(1年~1年半後が望ましい)												4回接種																							
結核 (BCG)	生後5~8か月の間に1回接種												①												1回接種																							
麻しん風しん混合 (MR)													① 1歳になったら1回目を接種												② 2回目は年長で接種												2回接種											
水痘 (みずぼうそう)													① → ② 3か月以上(6か月~1年が望ましい)												2回接種																							
日本脳炎													① → ② → ③ 6~28日 6か月以上(1年後が望ましい)												④ 4回目は小4で接種												4回接種											
2種混合(2期) (ジフテリア・破傷風混合ワクチン)													①												1回接種												小6で接種											
ヒトパピローマウイルス感染症 (子宮頸がん予防:HPV)													サーバリックス ① → ② → ③ 1か月以上 1回目から5か月以上かつ2回目から2か月半以上												3回接種																							
													ガーダシル ① → ② → ③ 1か月以上(2か月が望ましい) 2回目から3か月あける(1回目から6か月以上あけるのが望ましい)												3回接種																							
													シルガード9 ① → ② 5か月以上(6か月が望ましい)												2回接種																							
												シルガード9 ① → ② → ③ 1か月以上(2か月が望ましい) 2回目から3か月あける(1回目から6か月以上あけるのが望ましい)												3回接種																								



小学校6年生~令和5年度に26歳になる女性が対象  
1回目に接種したワクチンの種類で接種を完了してください。  
※シルガード9については、接種開始年齢によって接種回数異なりますのでご注意ください。

→については、定期接種実施要領に基づく標準的な接種期間になります。